



Hundeliv i Grønland

Denne folder er tænkt som hjælp til hundeejere i Grønland. Den indeholder information om de mest almindelige sygdomme hos hunde, og hvad du selv kan gøre. Vi anbefaler dog **altid**, at du kontakter en dyrlæge, hvis dit dyr er sygt, for at sikre at du får den rette hjælp.

Hvis du har slædehunde i slædehundredistriktet, er det Veterinær- og Fødevareremyndigheden i Grønland du skal kontakte.

Hvis det er et privatejet kæledyr, skal du kontakte en privat praktiserende dyrlæge, for eksempel dyreklinikken i Nuuk.

Rådene i denne vejledning er ikke udtømmende, men er tænkt som en hjælp.

Normale tegn hos en sund og rask hund:

- Er frisk og glad.
- Vil gerne gå, løbe og være social.
- Spiser og drikker som den plejer
- Har lyserøde og fugtige slimhinder i munden.

Hunde har en højere kropstemperatur end mennesker. En sund hund har en temperatur på 37,5 – 39,0 celsius. Den eneste måde du kan tjekke om din hund har feber, er med et termometer i endetarmen. Man kan ikke mærke feber på snuden, ørene eller andre steder på kroppen. Det kan derfor være en god ide at have et termometer derhjemme.

Inden du ringer til en dyrlæge

Vi anbefaler altid, at du kontakter en dyrlæge, hvis du tror dit dyr er sygt. Men inden du ringer til en dyrlæge, er det en god ide at tage nogle billeder og videoer af dit dyr og dens tilstand.

Husk når du ringer til en dyrlæge skal de vide følgende om dig og dit dyr:

- Dit dyrs navn
- Køn
- Race / størrelse
- Alder
- Hvad der er sket og for hvor lang tid siden

Gode råd om sygdom hos hunde

Må hunde få menneskemedicin?

Hunde og andre kæledyr kan som regel ikke tåle den medicin vi mennesker får. Du bør derfor kun give medicin som dyrlægen har ordineret.

Er der mad min hund ikke kan tåle?

Der er nogle af de ting vi mennesker spiser, som hunde ikke kan tåle. Hunde kan blandt andet ikke tåle:

- Chokolade
- Vindruer og rosiner
- Løg, hvidløg og andre løgplanter
- Koffein (kaffe)
- Rå kartofler eller rå kartoffelskræller

- Alkohol

Hvis din hund har spist noget af det der står her, er det en god ide at ringe til en dyrlæge for at få rådgivning.

Min hund er blevet bidt

Hvis din hund er blevet bidt og det bløder meget, skal du presse et rent klæde (viskestykke eller håndklæde) hårdt mod såret. Hold trykket indtil blødningen stopper. Når blødningen er stoppet, kan du forsigtigt rense såret.

Et overfladisk sår kan oftest klares med daglig vask. Det er en god ide at klippe eller barbere pelsen omkring såret, så du kan se det tydeligt og holde det rent.

Vask såret 1 gang dagligt med rigelige mængder rent postevand. Du kan evt. bruge en væske lavet til sårrens til mennesker gerne med klorhexidin (0,05 %).

Det er vigtigt at du holder øje med såret. Bidsår er fyldt med bakterier og der er en risiko for, at der går infektion i såret. Derfor bør såret vaskes grundigt 1 gang om dagen så længe det er friskt.

Tegn på infektion i et område er:

- Det bliver rødt
- Det hæver
- Der kommer pus
- Det lugter
- Der er smerter

Hvis såret begynder at vise tegn på infektion, bør du ringe til en dyrlæge.

Min hund har dårlig mave

Hunde kan få dårlig mave med opkast og- eller diarré, oftest fordi de har spist noget dårligt.

Hvis din hund har dårlig mave, kan du gøre følgende:

- Giv din hund skånekost, der er let for maven at fordøje. Skånekost kan du selv lave ved at koge ris sammen med kylling eller mager fisk (for eksempel torsk). Blandingen skal være 2/3 dele ris og 1/3 kylling/mager fisk.
- Giv skånekosten i små portioner 4-6 gange om dagen den første dag. Dagen efter 2-4 gange om dagen. Fortsæt med skånekost indtil din hund ikke kaster op mere og har haft normal afføring i 2 dage.
- Tilbyd den vand med elektrolytter. Kog 1 liter postevand og tilsæt 1 teske salt og 1 spiseske sukker. Når vandet er stuetemperatur, kan du tilbyde det til din hund. Du kan også blande lidt i dens mad.
- Giv gerne mælkesyrebakterier som ProKolin, Zoolac eller Canikur. Det kan købes hos dyrlæger, på nettet eller hos dyrehandlere.

Når din hund er rask igen, skal du over nogle dage trappe den over på normal kost ved at blande mere og mere af dens normale kost i skånekosten.

Hvis din hund ikke vil drikke eller virker dehydreret, bør du kontakte en dyrlæge.

Du skal være opmærksom på, at mave- og tarmproblemer kan udvikle sig og blive farlige for din hund. Den kan også have spist noget, der sidder fast i tarmen. Hvis din hund bliver meget dårlig, skal du kontakte en dyrlæge.

Min hund klør sig i ørerne



Hvis din hund begynder at klø sig i ørerne og den bliver ved med det igennem lang tid, kan den have fået problemer med ørerne og der kan være betændelse i dem.

Hunde kan få øregangsbetændelse, som kan klø og irritere meget. Hvis din hund begynder at klø sig meget i ørerne, kan du rense din hunds ører med en ørerens der er lavet til hunde. Dette kan købes hos en dyrlæge, dyrehandel eller over internettet.

Hunde har en meget lang ørekanal. Hæld derfor rigelige mængder ørerens i øret og massér den ydre øregang forsigtigt. Fjern derefter ørevoks fra det ydre øre med noget vat. Du må ikke bruge vatpinde, da du kan risikere at lave skader inde i øret.

Hvis din hund bliver ved med at have problemer med ørene, bør du kontakte en dyrlæge.

Flere eller langvarige episoder med kløe fra ører, poter og huden kan skyldes at din hund har allergi. Du bør derfor kontakte en dyrlæge, hvis din hund ofte har problemer med kløe i ører, poter eller andre steder på huden.

Min hund lugter ud af munden

Hunde bør få børstet tænder ligesom mennesker. Dette er for at forebygge tandsten og tandkødsbetændelse.


Det er derfor en god ide at lære hunden som hvalp at få børstet tænder 1-2 gange dagligt. Du kan bruge en almindelig blød tandbørste, eller du kan købe en lavet specielt til hunde. Det er dog meget vigtigt at du ikke bruger tandpasta lavet til mennesker, da hunde ikke kan tåle det.

Hvis din hund lugter kraftigt ud af munden, skyldes det oftest, at den har fået tandsten og evt. også tandkødsbetændelse. For at få det behandlet skal den tilses af en dyrlæge.

Min hund kører på numsen

Hvis din hund gnider numsen hen ad gulvet, kan det være et tegn på problemer med analkirtlerne.

Hunde har to analkirtler, som sidder på hver side af endetarmen (anus). Analkirtlerne kan blive fyldte og der kan gå betændelse i dem. Hvis din hund har betændelse i analkirtlerne er det smertefuldt og kræver dyrlægehjælp.



Hvis din hund gnider numsen hen ad gulvet eller lignende, kan du forsøge selv at tømme analkirtlerne.

Du tømmer dem ved at indsætte din pegefinger i din hunds anus. Herefter presser du forsigtigt med en tommelfinger uden på, under analkirtlen. Der hvor der på billedet er en rød ring. Hav et stykke papir klar til at tørre sekretet væk bagefter.

Hjælper dette ikke eller får din hund betændelse i analkirtlerne, kan det blive nødvendigt at få den tilset af en dyrlæge.

Særligt for tæver

Løbetid

Alle voksne tæver (hunhunde) vil cirka hver 6. – 12. måned gå i løbetid, medmindre de er steriliseret. Hos nogle hunde kan tidspunktet dog variere, og hvis hunden er meget ung, kan det være lidt forskelligt, hvornår de går i løbetid.

Løbetid er helt normalt, og man vil som ejer typisk opdage det ved, at hunden bløder lidt fra skeden. I denne periode kan hun blive parret, og kan blive drægtig (gravid). Det er derfor vigtigt at holde tæven væk fra hanhunde, hvis ikke man ønsker hvalpe.

Tæver i løbetid skal isoleres bag et sikkert hegn eller holdes inde i huset, for at undgå uønskede hvalpe. Når tæven er i løbetid og skal luftes, skal du have den i snor og du må ikke efterlades uden opsyn. At give sin tæve underbukser på eller andet stof vil ikke være nok til at forhindre parring.

Livmoderbetændelse

Tæver, som ikke er steriliseret, kan udvikle livmoderbetændelse.

Livmoderbetændelse er en livstruende sygdom, hvor hundens livmoder bliver fyldt med betændelse (pus) og hunden til sidst vil dø.

Livmoderbetændelse opstår oftest 1-2 måneder efter at tæven har været i løbetid. Symptomerne du skal være opmærksom på ved livmoderbetændelse er:

At tæven:

- Virker mere træt
- Drikker mere
- Tisser mere
- Spiser mindre
- Får feber
- Bliver tiltagende dårlig

Nogle hunde kan få det så dårligt, at de begynder at kaste op, får dårlig mave eller der kan ses gult, grønt eller rødbrunt ildelugtende flåd fra skeden.

Livmoderbetændelse kræver næsten altid en operation for at tæven kan blive rask. Hvis ikke du kan få din hund til en dyrlæge, skal den aflives. Hvis du mistænker, at din tæve har livmoderbetændelse, skal du omgående kontakte en dyrlæge.

Gode ting at have derhjemme

Følgende liste er forslag til, hvad der er godt at have i hjemmet når man har hund:

- Klorhexidin sårrens. Koncentration maks. 0,05%
- Mælkesyrebakterier (For eksempel Prokolin, Zoolac eller Canikur)
- Ørerens til hunde.
- Termometer
- Klipper/trimmer til pelsen.

Vi anbefaler altid at man kontakter en dyrlæge før man behandler sin hund.